

Листок-вкладыш: информация для потребителя
Ибупрофен ДИП, гель для наружного применения (50 мг+30 мг)/г
Ибупрофен / левоментол (# L-ментол)

Перед началом применения лекарственного средства полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Всегда применяйте лекарственное средство в точности с данным листком или рекомендациями лечащего врача.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что представляет собой лекарственное средство Ибупрофен ДИП и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед применением лекарственного средства Ибупрофен ДИП
3. Как применять лекарственное средство Ибупрофен ДИП
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение лекарственного средства Ибупрофен ДИП
6. Содержимое упаковки и прочие сведения



1. Что представляет собой лекарственное средство Ибупрофен ДИП и для чего его применяют

Гель Ибупрофен ДИП представляет собой комбинированное лекарственное средство для наружного применения, в состав которого входят ибупрофен и левоментол.

Ибупрофен относится к группе нестероидных противовоспалительных средств и обладает выраженным противовоспалительным действием. Это приводит к снятию боли, уменьшению отека.

Левоментол при нанесении на кожу сужает кровеносные сосуды, вызывая ощущение холода и обезболивающий эффект. Действие ментола проявляется на нервных окончаниях кожи, вызывая гиперемию кожи и оказывая отвлекающее действие, что приводит к облегчению боли при повреждениях мышц, сухожилий и суставов.

Водно-спиртовая основа геля также оказывает успокаивающее и быстрое охлаждающее действие при нанесении на кожу.

После нанесения гель легко проникает в кожу и подкожные ткани, уменьшая воспаление и связанные с ним боль и отек.

Гель Ибупрофен ДИП применяется для симптоматического лечения следующих состояний:

- ревматической, мышечной и суставной боли;
- боли и отека при растяжениях сухожилий, вывихах и спортивных травмах.

Гель Ибупрофен ДИП показан для применения у взрослых.

Если при применении лекарственного средства в течение 10 дней симптомы заболевания не проходят либо усугубляются, следует обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением лекарственного средства Ибупрофен ДИП
Не применяйте лекарственное средство Ибупрофен ДИП:

- если у Вас имеется повышенная чувствительность (аллергия) к ибупрофену, левоментолу и/или к любому из вспомогательных компонентов лекарственного средства (см. раздел 6 листка-вкладыша);